

hiện các biện pháp thúc đẩy nuôi con bằng sữa mẹ tại cơ sở y tế. Về mặt nhân khẩu học, phần lớn bà mẹ sinh con nằm trong độ tuổi lý tưởng (77,88% từ 21-35 tuổi) và sinh thường chiếm ưu thế (55,06%), tạo điều kiện thuận

SUMMARY**TREATMENT OUTCOME OF SURGERY FOR HEMOPTYSIS IN PULMONARY TUBERCULOSIS PATIENTS AT THE NATIONAL LUNG HOSPITAL**

được từ BN được trình bày dưới dạng vô danh.

III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

ĐMP	2	8	5	20	7	14	>0,05
O phình/giả phình	8	32	12	48</			

không có tiền sử HRM hoặc tiền sử lao phổi trước đây. Những BN HRM lần đầu thường sẽ rất lo lắng về tình trạng sức khỏe và sẽ sớm tìm đến chăm sóc y tế nên số lượng vi khuẩn lao trong đờm chưa nhiều. Một nguyên

- tiến trình chấm dứt bệnh lao. Nhà xuất bản Y học
2. **World Health Organization** (2024). Global Tuberculosis Report.
 3. **Andrew W, Derek CA, Simon F, Luciano G, Mervyn S** (201